unisanté
Centre universitaire de médecine générale
et santé publique • Lausanne

UNIL | Université de Lausanne

Association between patient sex and familial hypercholesterolemia and long-term cardiovascular risk factor management five years after acute coronary syndrome

Kristina Krasieva

Grand Prix Santé Cardiovasculaire 2024 - LVCV

26.09.2024

- Après SCA, le controle à long terme des FRCV permet de diminuer le risque de récidive
- Peu de données sur suivi à long terme chez patients FH
- Large échantillon de 3,139 patients en Suisse





Krasieva et al, Circ Outcomes, 2024





Krasieva et al, Circ Outcomes, 2024

unisanté
Centre universitaire de médecine générale
et santé publique • Lausanne

UNIL | Université de Lausanne

Conclusions 5 ans après SCA

- F moins probables que les H d'avoir une statine ou ttt hypolipémiant combiné
- F atteignaient moins souvent les cibles de LDL-c que les H, indépendamment de la présence de FH
- Patients avec FH ont un ttt hypolipémiant plus intensif que les non-FH mais ont plus de risque de ne pas atteindre les cibles de LDL-c

= Optimisation nécessaire pour le management à long terme des patients SCA et FH, surtout les femmes!

Merci pour votre attention! kristina.krasieva@gmail.com